

POINTS DE VIGILANCE CONTRE LES ERREURS DE PREPARATION DES DOSES DE VACCIN PFIZER

Plusieurs erreurs de préparation ont été récemment signalées avec le vaccin Pfizer : du sérum physiologique a ainsi été injecté à la place du vaccin, entraînant l'absence d'immunisation des personnes concernées.

En cas d'erreur, il est important de signaler la situation à l'ARS qui pourra proposer une conduite à tenir pour garantir que le patient soit correctement protégé.

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil

Cocher « professionnel de santé » puis « Événements indésirables graves associés à des soins (EIGS) - déclaration - 1ère partie »

Quelques points de vigilance peuvent être mis en place pour minimiser le risque d'erreur

A. Formation

Il est recommandé d'avoir une expérience pratique dans l'utilisation des flacons multi-doses de médicaments injectables avant de commencer la vaccination à domicile. A défaut, il conviendra de se former auprès d'un(e) collègue, de consulter la documentation du laboratoire PFIZER et de visionner un tutoriel :

visionnage de la vidéo explicative <https://www.dailymotion.com/video/x817i66>

B. Lieu de préparation

La préparation de la seringue au domicile du patient doit être réalisée juste avant l'injection, dans de bonnes conditions de propreté et de tranquillité. Il est recommandé de ne pas préparer les seringues à l'avance.

C. Matériels

Le matériel nécessaire à la reconstitution et préparation des doses de vaccin Pfizer (seringues de 3ml, seringues tuberculiques, sérum physiologique, flacon de vaccin Pfizer, tampon, alcool, etc.) doit être préalablement vérifié, identifié et disposé pour éviter tout risque de confusion.

D. Préparation proprement dite

Les flacons non ouverts de vaccin Pfizer possèdent un opercule de couleur violette : celui-ci doit être retiré par le soignant avant de prélever les doses, permettant ainsi de s'assurer que le flacon n'a pas été percuté auparavant.

En l'absence de l'opercule, le flacon ne doit pas être utilisé.

Les flacons de vaccin Pfizer dans lesquels les 7 doses ont été prélevées et les flacons périmés doivent être immédiatement placés dans le container à DASRI (boîte à aiguilles).

